

Lathund för definition av vårdrelaterad infektion

Åtgärdsrelaterad VRI = punkt 1. Vårdtidsrelaterad VRI = punkterna 2 och 3.

1. Varje infektion som bedöms ha samband med:

- ett tidigare ingrepp eller
- en behandling,
- oberoende av i vilken vårdform ingreppet/behandlingen utförts eller ordinerats.

Tre typer kan särskiljas:

- a) Postoperativ infektion:** ytlig eller djup infektion i operationsområdet som debuterar
- <30 dagar efter kirurgi utan implantat eller
 - <1 år efter kirurgi med implantat.

b) Övrig ingreppsrelaterad infektion:

Infektion som kan relateras till tidigare eller pågående användning av åtgärder som bryter eller försvagar kroppens naturliga infektionsbarriärer.

- kateter, kärlinfart, dränage, intubation, punktion, injektion m fl åtgärder

c) Läkemedelsrelaterad infektion:

- infektion som uppkommer till följd av direkt läkemedeleffekt;
 - t ex *Clostridium difficile*-enterit i samband med antibiotikaanvändning
- En följd av läkemedels effekt på infektionsförsvaret.
 - T ex vid behandling med cytostatika (inkl methotrexate),
 - immunhämmare
 - t ex azatioprin, mykofenolatmofetil, ciklosporin, monoklonala antikroppar och TNF α -hämmare eller
 - Kortison behandling >1 mån
 - Vuxna prednisolon ≥ 15 mg/d –
 - Barn $\geq 0,25$ mg/kg alt ≥ 15 mg/d.

2. Varje infektion som debuterar två dygn eller mer (**≥ 48 timmar**) efter inskrivning inom slutenvården oberoende av tidigare vård eller behandling.

3. Varje infektion som debuterar **inom 48 timmar efter utskrivning** från slutenvård.

Obs! Bärarskap av olika typer av smittämnen (MRSA, VRE, ESBL) utan infektionstecken skall inte betraktas som vårdrelaterad infektion.

2019-03-14

Signar Mäkitalo
Region Gävleborg